

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ГАСТРОПАНЕЛЬ®

Оптимальное время для процедуры взятия крови — утро, натощак.

- За 1 неделю до исследования по согласованию с лечащим врачом отменить препараты, влияющие на секрецию желудочного сока (омепразол, омез, ранитидин, фамотидин, циметидин, гастроцепин, париет, некسيوم, ультоп, ортанол и другие).
- За 3 суток до исследования ограничить физические нагрузки.
- За 1 день до проведения исследования необходимо воздержаться от приема антацидных препаратов, нейтрализующих соляную кислоту в желудке (гевискон, альмагель, маалокс, гастал, ренни и другие).
- За 24 часа перед взятием крови исключить прием алкоголя.
- За 12 часов — напитков, содержащих кофеин.
- За 1 час - отказ от курения.
- Исследование проводят натощак. Не менее, чем за 10-12 часов до взятия крови отказаться от приема пищи и напитков, за исключением питьевой воды. Последний перед взятием крови прием пищи — легкий.
- Перед взятием крови необходимо пребывание в состоянии покоя не менее 20 минут.

Дополнительная информация

Интерпретация результатов теста и расчет рисков проводятся специальной программой GastroSoft® компании Biohit Oyj. Результаты анализа должен оценивать лечащий врач с учетом дополнительных анамнестических и клинико-лабораторных данных.